



Sin Conservantes

relys® 101

Solución oftálmica estéril con sT-LysYal®

RELYS® es una solución oftálmica estéril que contiene sT-LysYal®, un agregado supramolecular que puede actuar sobre las estructuras de la superficie ocular modulando la restauración del equilibrio fisiológico de la película lagrimal.

¿CUÁLES SON SUS INDICACIONES?

RELYS® está indicado en caso de ojo seco, fatiga visual/uso prolongado de pantallas, enrojecimiento, lagrimeo excesivo, sensación de escozor y picor en los ojos debido a fenómenos irritativos (exposición excesiva a polvo, humo, viento, sol, conducción, etc.) y sensación de arena en los ojos.

¿QUÉ PASA SI SE UTILIZAN LENTES DE CONTACTO?

RELYS® también puede utilizarse con lentes de contacto. La instilación antes y durante el uso de lentes de contacto aumenta la comodidad y ayuda a prevenir posibles complicaciones oculares. La instilación de **RELYS®**, incluso si es frecuente, no tiene contraindicaciones y garantiza una comodidad duradera.

INSTRUCCIONES DE USO (MONODOSIS Y MULTIDOSIS)

Monodosis

Abrir la bolsa protectora y separar un vial monodosis.

Abrir el vial monodosis con cuidado, girando y tirando del tapón.

Evitar el contacto con la zona abierta.

Presionar suavemente el vial monodosis e instilar 1-2 gotas por ojo, teniendo cuidado de no tocar el ojo con la punta del mini envase.

Cerrar el vial monodosis y guardarlo dentro de la bolsa.

El líquido restante se puede utilizar en las 12 horas siguientes a la apertura inicial.



Multidosis

Instilar 1 o 2 gotas en el ojo, presionando ligeramente el cuerpo del vial.

Cerrar el vial con cuidado.

Utilizar en los 90 días siguientes a la apertura inicial.

El procedimiento se puede repetir varias veces al día, según sea necesario.



ADVERTENCIAS

Producto solo para uso oftálmico externo. Se recomienda continuar utilizando **RELYS®** durante unos días después de la desaparición de los síntomas.

Una vez aplicado, dejar pasar 10-15 minutos antes de instilar un medicamento oftálmico externo.

Tras la instilación, el usuario puede experimentar visión borrosa temporal; este efecto desaparece en pocos segundos. Esperar a que se resuelva la visión borrosa antes de realizar cualquier actividad que requiera claridad visual (conducir un vehículo, utilizar maquinaria, etc.). Evitar desechar el envase al medio ambiente después de su uso. No utilizar si el vial está dañado. No utilizar después de la fecha de caducidad que figura en el envase. No ingerir. Mantener fuera del alcance y de la vista de los niños. Mantener alejado de fuentes de calor y conservar a temperatura ambiente.

CONTRAINDICACIONES Y EFECTOS ADVERSOS

No existen contraindicaciones para el uso del producto.

No usar en caso de hipersensibilidad a cualquiera de los componentes.

No se conocen efectos indeseados de importancia clínica. Inmediatamente después de la aplicación puede aparecer sensación de escozor, que tiende a desaparecer por sí sola tras un breve periodo de tiempo. Si apareciesen efectos indeseados diferentes a los descritos, interrumpa la aplicación y consulte a su médico.

EMBARAZO Y LACTANCIA

Aunque no se conocen efectos sobre el embarazo y la lactancia, el uso de **RELYS®** en estas situaciones deberá estar sujeto a la opinión del médico.

COMPOSICIÓN

sT-LysYal® (agregado supramolecular de ácido hialurónico, lisina, timina y cloruro sódico), manitol, citrato de sodio tribásico, ácido cítrico, agua.

FORMATO

Caja con 20 viales monodosis de 0.35 ml

Caja con un vial multidosis de 10 ml



Rev. 00 de 01/02/2023



SILDEHA Pharma srl
Via Egadi 7 - Milano (IT)



SILDEHA Swiss SA
Via delle Scuole 5
CH 6900 Paradiso

Distribuidor



FARMAMIX VISIÓN S.L.
08174 Amposta 20,
Sant Cugat del Vallès - SPAIN

