



# SANODIN® HYALO

GEL ORAL SIN ALCOHOL

## Qué son las aftas

Las aftas son un trastorno muy común y molesto. Estas lesiones aparecen en la mucosa de la cavidad bucal (labios, mejillas, lengua, etc.).

Estas aftas producen una sensación de dolor extremadamente agudo, sobre todo cuando se estimulan por medios mecánicos o químicos (alimentos ácidos o salados, calor, etc.).

## Cómo reconocer las aftas

Las aftas empiezan a aparecer como una pequeña vesícula de unos pocos milímetros de diámetro. Después de 24-48 horas esta vesícula se rompe y se convierte en una pequeña erosión redonda de color blanco con contornos de color rojo intenso, evolucionando hacia una úlcera dolorosa y molesta.

## Indicaciones

Aftas bucales, estomatitis aftosa y pequeñas lesiones que se encuentran en la boca.

## Instrucciones de uso

1. Retire el tapón del tubo.
2. Asegure el tubo dispensador al cuerpo del tubo. Asegúrese de que esté firmemente en su lugar.
3. Retire el tapón del tubo dispensador.
4. Aplique SANODIN® HYALO a toda el área de tratamiento para cubrir completamente la lesión.
5. Evite tocar el área con la lengua durante al menos dos minutos para que el gel pueda crear una capa protectora.
6. Después de cada aplicación, vuelva a colocar el tapón en el tubo dispensador.
7. Coloque el producto en su envase sin quitar el dispensador del cuerpo del tubo.
8. SANODIN® HYALO se puede aplicar 2-3 veces al día o más según sea necesario.
9. No aplique el producto una hora antes y una hora después de la ingesta de comidas.

## Ingredientes

Agua, Alcohol polivinílico, Sorbitol, Glicirrizato de amonio, Benzoato sódico, Sorbato de potasio, Ácido cítrico, Hialuronato de sodio.

## ⚠ Advertencias

No conservar en el frigorífico.

Es inocuo en caso de ser ingerido.

No se recomienda el uso de este producto en pacientes con hipersensibilidad conocida a alguno de sus ingredientes.

No utilizar si el envase está dañado y/o abierto.

Mantener fuera del alcance de los niños.

Evitar el contacto con los ojos.

Si la dolencia persiste, consulte a su médico.

El producto debe usarse dentro de los 12 meses posteriores a la apertura inicial.

Periodo de validez: 36 meses

CE 0373

Producto Sanitario

Rev. 0 25/11/20

10 ml e



Distribuido en España por:  
**LABORATORIOS ERN, S.A.**  
Perú, 228  
08020 Barcelona, España



PIETRASANTA PHARMA S.p.A.  
Via di Caprino, 7  
55012 Capannori (LU) - Italia  
[www.pietrasantapharma.it](http://www.pietrasantapharma.it)