

Melilax

MICROENEMA CON PROMELAXIN

FÓRMULA PATENTADA



COMPLEJO ACTIVO DE MIELES Y POLISACÁRIDOS DE ALOE Y MALVA

Fuelle exclusivo
Easy Use
+ fácil de aplicar

Doble Acción
Libera el intestino sin irritar,
protegiendo la mucosa rectal

sin
gluten
gluten
free

PRODUCTO SANITARIO
Clase IIb

Melilax es un **microenema innovador a base de miel** que aúna una acción evacuante equilibrada con una acción protectora y lenitiva de la mucosa rectal, útil para contrarrestar las molestias, la irritación y la inflamación que acompañan al estreñimiento.

La **doble acción de Melilax** se obtiene gracias a **PROMELAXIN**, un complejo activo de mieles de néctar y de mielada cuidadosamente seleccionadas y elaboradas en función de su contenido en monosacáridos, polisacáridos y melanoidinas, enriquecido con la **fracción polisacáridica** del Aloe y la Malva.

CÓMO ACTÚA

Melilax ejerce una acción evacuante no irritante, induciendo un estímulo fisiológico y equilibrado de activación de la defecación.

Melilax además, gracias a sus propiedades similares a las del moco y a su viscosidad, protege la mucosa rectal durante el paso de las heces, imitando la acción lubricante del moco fisiológico.

Estas propiedades especiales, junto con su acción antioxidante, confieren al producto la capacidad de proteger y aliviar la mucosa, ejerciendo una acción antiinflamatoria indirecta debida a las características físicas del producto.

INDICACIONES

Melilax está indicado para el tratamiento del estreñimiento, incluso en presencia de hipersensibilidad visceral (como en caso de colon irritable), fisuras anales y hemorroides.

El producto también es apto para su empleo durante el embarazo y la lactancia así como en lactantes.

COMPOSICIÓN

Sustancias funcionales 73,2 %


Promelaxin complejo activo de mieles y polisacáridos de Aloe y Malva

Título en: monosacáridos $\geq 50\%$, polisacáridos (Peso Molecular $>20\,000$ dalton) $\geq 0,3\%$


Contiene además: mezcla hidroglicérica, zumo de Limón, aceite esencial de Lavanda.

MODO DE EMPLEO

1) Abrir el microenema quitando el cubrecánula de seguridad:



- Sujetar el anillo redondo blanco situado sobre el fuelle
- Con la otra mano doblar el cubrecánula hasta provocar la rotura y la completa separación del anillo



- Quitar el cubrecánula

2) Aplicar unas gotas de producto en la zona perianal e introducir delicadamente la cánula en el recto.

3) Comprimir completamente el microenema y, una vez finalizada la aplicación, mantenerlo presionado hasta extraer totalmente la cánula, para evitar que el producto sea reaspirado.

Fórmula Patentada

Patente n.º 102012902100704

sin gluten
gluten free

Adecuado para celíacos

MELILAX ADULT



Indicado para adultos y jóvenes a partir de 12 años de edad. Apto también durante el embarazo y la lactancia.

POSOLOGÍA

1 microenema de 10 g cuando se requiera. En caso de estreñimiento persistente, aplicar 2 dosis consecutivamente.

Caja de 6 microenemas desechables con cubrecánula para adultos y jóvenes de 10 g cada uno

MELILAX PEDIATRIC



Caja de 6 microenemas desechables con cubrecánula para niños y lactantes de 5 g cada uno

Indicado para niños y lactantes.

Para facilitar la aplicación del microenema es preferible poner al niño sobre el lado izquierdo con las rodillas dobladas hacia el abdomen.



POSOLÓGÍA

Niños de 3 a 12 años:

1 microenema de 5 g cuando se requiera.

En caso de estreñimiento persistente, aplicar 2 dosis consecutivamente.

Niños de 1 a 3 años:

1 microenema de 5 g cuando se requiera.

Lactantes de 0 a 1 año:

medio microenema de 5 g cuando se requiera.

ADVERTENCIAS

No utilizar en caso de hipersensibilidad o alergia individual a uno o más componentes. En caso de estreñimiento persistente es importante consultar a un médico para descartar otras patologías.

El microenema es desechable, por lo tanto no debe reutilizarse si se administra media dosis, como en el caso de los lactantes.

Conservar a temperatura ambiente, alejado de fuentes de calor y protegido de la luz. Mantener el producto fuera del alcance de los niños. La fecha de caducidad se refiere al producto sin abrir y correctamente conservado.

CADUCIDAD

Ver la fecha de caducidad indicada en la caja. No utilizar después de la fecha de caducidad indicada.

ENVASE EN VENTA

Melilax Adult: 6 microenemas desechables con cubrecánula para adultos y jóvenes de 10 g cada uno

Melilax Pediatric: 6 microenemas desechables con cubrecánula para niños y lactantes de 5 g cada uno

EL ESTREÑIMIENTO

El término "estreñimiento" se utiliza para indicar el aumento del tiempo de permanencia de las heces en la parte final del intestino. En esta situación se produce una acumulación de material fecal seco y duro debido a la excesiva reabsorción de líquidos: el volumen de las heces es pequeño y se emiten **con poca frecuencia** (incluso menos de 3 evacuaciones a la semana) y con **dificultad y/o dolor** (a causa de la dureza de las heces). En algunos casos el estreñimiento también puede manifestarse con una sensación de evacuación incompleta aunque la frecuencia sea normal, o con la necesidad de esforzarse mucho para evacuar.

LAS CAUSAS

Las principales causas que originan el problema, en cualquier franja de edad, pueden ser un **estilo de vida inadecuado** (alimentación no equilibrada, insuficiente ingesta de agua, verdura y fruta, poca actividad física y vida sedentaria), **cambio de hábitos personales o de condiciones climáticas** (por ejemplo en caso de viajes), **uso de determinados medicamentos, presencia de enfermedades gastrointestinales o metabólicas** (por ejemplo síndrome de intestino irritable), o bien **condiciones particulares como estrés, inmovilidad-encamamiento (sobre todo en ancianos)**.

Las hemorroides, las fisuras anales y los prolapsos pueden producir estreñimiento o ser una consecuencia de este. De hecho, la dificultad de evacuación y la irritación local desencadenan un círculo vicioso que impide tanto resolver el estreñimiento como mejorar los problemas derivados de este. Una causa frecuente de estreñimiento es el **control voluntario del estímulo de evacuación**, problema común en los niños, sobre todo en los primeros 2-3 años de vida. En los niños, por otra parte, también puede manifestarse **durante estados febriles prolongados** que provoquen situaciones de leve deshidratación.

CONSEJOS ÚTILES

En muchos casos el estreñimiento puede corregirse con una dieta rica en agua y fibras: estas se unen en diferente proporción al agua, contribuyendo a aumentar el volumen de las heces. También es útil la actividad física regular.



www.melilax.es



0373

Fecha de la última revisión: 02/2016



Aboca S.p.A. Società Agricola - Loc. Aboca, 20 - 52037 Sansepolcro (AR) - Italia
www.aboca.com

Empresa con sistema de gestión de calidad ISO 9001 e ISO 13485
y sistema de gestión medioambiental ISO 14001 certificados.