

**Alimento para Usos Médicos Especiales**

30 sobres de 10,4 g  
312 g

Módulo de Triglicéridos Omega 3 de cadena muy larga (DHA)

**INFORMACIÓN NUTRICIONAL**

	<b>Por sobre (10 ml)</b>	<b>Por 100 ml</b>
<b>Valor energético (kJ)</b>	185,1	1851
<b>(kcal)</b>	44,3	443
<b>Grasas (g)</b>	4,28	42,8
de las cuales:		
saturadas (g)	0,68	6,8
monoinsaturadas (g)	2,46	24,6
poliinsaturadas (g)	1,15	11,5
<b>Ácidos grasos Omega-3</b>		
Docosahexaenoico (22:6ω3, DHA) (g)	0,5	5,0
Eicosapentaenoico (20:5ω3, EPA) (g)	0,06	0,6
Docosapentaenoico (22:5ω3, DPA) (g)	0,04	0,4
<b>Hidratos de carbono (g)</b>	1,61	16,1
de los cuales:		
azúcares (fructosa) (g)	1,04	10,4
polialcoholes (g)	0,42	4,2
<b>Fibra alimentaria (g)</b>	0	0
<b>Proteínas (g)</b>	0	0
<b>Sal / sodio (g)</b>	0	0
<b>Vitaminas y minerales (g)</b>	0	0,15

**INGREDIENTES:** Agua, aceite de oliva, fructosa, **aceite de pescado** concentrado en ácidos grasos Omega-3, humectante (glicerina), emulgente (sucroéster), aroma (naranja, aceite de romero), espesante (goma xantana), corrector de la acidez (ácido cítrico), antioxidantes (extracto rico en tocoferoles) y conservadores (sorbato de potasio, benzoato de sodio). **Sin gluten ni lácteos.**

**APARIENCIA:** Suspensión viscosa de color crema a amarillo pastel.

**INDICACIONES:** Para el manejo dietético de aquellas situaciones en las que se precise un módulo de DHA (Tridocosahexanoína-AOX®) o un enriquecimiento de la dieta con este triglicérido, como en las Ambliopías con un componente de déficit de DHA de causa nutricional o por toxicidad al alcohol, Trastornos de la Atención, con y sin Hiperactividad, pacientes oncológicos, con Fibrosis Quística, Malabsorción Lipídica y Trastornos del Metabolismo.

**MODO DE EMPLEO:** No necesita preparación. Abrir el sobre y administrar por vía oral. Tomar preferentemente con las comidas solo o mezclado con otros alimentos.

**CONSERVACIÓN:** Una vez abierto el sobre consumir inmediatamente. Guardar al abrigo de la luz.

**ADVERTENCIAS:** Producto destinado a niños de más de 3 años. Este producto debe utilizarse bajo supervisión médica. No debe usarse como única fuente de alimento. En los tratamientos con fármacos pro o anticoagulantes, debe tenerse en cuenta la acción anticoagulante de los ácidos grasos Omega 3 de cadena muy larga cuando se administran en cantidades elevadas. **MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.** Envasado en atmósfera protectora. Consumir preferentemente antes de la fecha indicada en el sobre.

Fecha última revisión: Octubre 2021



**Alimento para Fins Medicinais Específicos**

30 saquetas de 10,4 g  
312 g

Módulo de Triglicéridos Ómega-3 de cadeia muito longa (DHA)

**INFORMAÇÃO NUTRICIONAL**

	<b>Por saqueta (10 ml)</b>	<b>Por 100 ml</b>
Valor energético (kJ)	185,1	1851
(kcal)	44,3	443
Lípidos (g)	4,28	42,8
dos quais:		
saturados (g)	0,68	6,8
monoinsaturados (g)	2,46	24,6
poli-insaturados (g)	1,15	11,5
Ácidos gordos Ómega-3		
Docosa-hexaenóico (22:6 $\omega$ 3, DHA) (g)	0,5	5,0
Eicosapentaenóico (20:5 $\omega$ 3, EPA) (g)	0,06	0,6
Docosapentaenóico (22:5 $\omega$ 3, DPA) (g)	0,04	0,4
Hidratos de carbono (g)	1,61	16,1
dos quais:		
açúcares (frutose) (g)	1,04	10,4
polióis (g)	0,42	4,2
Fibra alimentar (g)	0	0
Proteínas (g)	0	0
Sal / sódio (g)	0	0
Vitaminas e minerais (g)	0	0,15

**INGREDIENTES:** Água, azeite de oliva, frutose, **óleo de peixe** concentrado em ácidos gordos Ómega-3, humidificante (glicerina), emulsionantes (ésteres de sacarose de ácidos gordos), aroma (laranja, óleo de rosmaninho), espessante (goma xantana), regulador de acidez (ácido cítrico), antioxidantes (extracto rico em tocoferóis) e conservantes (sorbatos de potássio, benzoato de sódio). **Isento de gluten. Sem lactose.**

**APARÊNCIA:** Suspensão viscosa de cor creme a amarelo pastel.

**INDICAÇÕES:** Para a gestão nutricional de situações em que é necessário um módulo de DHA (Tridocosahexanoína-AOX<sup>®</sup>) ou um enriquecimento da dieta com este triglicérido, como nas ambiopias com um componente de défice de DHA de causa nutricional ou por toxicidade ao álcool, distúrbios de atenção, com e sem hiperatividade, doentes oncológicos, com fibrose quística, má absorção de lípidos e distúrbios metabólicos.

**MODO DE UTILIZAÇÃO:** Não precisa de preparação. Abrir a saqueta e administrar por via oral. Tomar de preferência com as refeições sozinho ou misturado com outros alimentos.

**CONSERVAÇÃO:** Depois de aberta a saqueta, consumir imediatamente. Guardar ao abrigo da luz.

**ADVERTÊNCIAS:** Produto destinado a crianças com mais de 3 anos. Este produto deve ser usado sob supervisão médica. Não deve ser usado como única fonte alimentar. Nos tratamentos com fármacos pró ou anticoagulantes, deve ter-se em conta a ação anticoagulante dos ácidos gordos Ómega-3 de cadeia muito longa quando administrados em grandes quantidades. **MANTER FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS.** Acondicionado em atmosfera protetora. Consumir de preferência antes da data indicada na saqueta.

Data da última revisão: Outubro 2021

